

regimen パーシエタ+ハーセプチン+ドセタキセル療法 **疾患名** 乳がん

regimen 詳細

Pertuzumab	840mg	初回
パーシエタ		
Pertuzumab	420mg	2回目以降
パーシエタ		
trastuzumab	8mg/kg	初回
トラスツズマブ (ハーセプチン)		
trastuzumab	6mg/kg	2回目以降
トラスツズマブ (ハーセプチン)		
docetaxel	75mg/m ²	
ドセタキセル		

特記事項

3週間ごとに繰り返す (術前・術後補助は1.2Mまで可)

ペルツズマブ (パーシエタ)

初回投与時には840mgを、2回目以降は420mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注。

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

※前回投与から6週間以上間隔が空いた時は、改めて840mgで投与を行う。

トラスツズマブ (ハーセプチン)

初回投与時には8mg/kgを、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。

※投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与を行う。